

Spatiotemporal variability in soil properties and composition in mangrove forests in Baía de Todos os Santos (NE Brazil)

Mônica Arlinda Vasconcelos Ramos^{1,2}, Augusto Pérez-Alberti^{1*}, Gabriel Nuto Nóbrega³, Xosé Luis Otero^{1,4}

¹ CRETUS. Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola, Facultade de Bioloxía, Universidade de Santiago de Compostela, Spain 1; e-mail@e-mail.com

² Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas (CCAAB), Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Brazil.

³ Departamento de Ciências do Solo, Centro de Ciências Agrárias (CCA), Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brazil.

⁴ REBUSC, Rede de Estacións Biolóxicas da Universidade de Santiago de Compostela, Estación de Bioloxía Mariña da Graña (Ferrol), Spain.

Table S1 - Physical chemical attributes and soil components of the mangroves of Ilha de Maré, Ponta Grossa, Pitinga and Cacha Pregó.

		pH		Eh (mV)		Fe total (%)		Areia (%)
		DS	WS	DS	WS	DS	WS	
IM	S	6.9 ^{ab} (0.1)	6.7 ^a (0,1)	161 ^{a*} (13)	111 ^b (6)	2.3 ^a (0.3)	2.3 ^a (0.5)	43.7 ^b (6.7)
	D	7.2 ^a (0.1)	7.2 ^a (0.1)	97 ^{b*} (6)	74 ^b (13)	2.1 ^a (0.0)	2.6 ^a (0.1)	51.4 ^c (9.0)
PT	S	4.8 ^{b*} (0.4)	6.8 ^a (0.2)	164 ^a (14)	146 ^a (8)	0.5 ^b (0.3)	0.4 ^c (0.1)	89.8 ^a (2.0)
	D	5.9 ^{a*} (0.4)	7.2 ^a (0.1)	187 ^{a*} (1.0)	140 ^a (13)	0.5 ^b (0.1)	0.6 ^c (0.2)	89.4 ^a (2.4)
CP	S	7.1 ^a (0.2)	7.1 ^a (0.2)	144 ^a (18)	102 ^b (13)	0.8 ^b (0.2)	1.3 ^b (0.3)	84.9 ^a (3.3)
	D	7.0 ^a (0.0)	7.3 ^a (0.3)	111 ^{ab} (17)	77 ^{ab} (41)	1.1 ^b (0.3)	1.2 ^b (0.2)	77.4 ^b (3.1)
PG	S	7.0 ^{ab} (0.0)	7.0 ^a (0.0)	134 ^a (3.5)	112 ^b (3.5)	0.5 ^b (0.5)	0.4 ^c (0.3)	87.3 ^a (8.4)
	D	7.3 ^a (0.1)	7.3 ^a (0.1)	111 ^{ab} (2.1)	96 ^b (15)	0.5 ^b (0.2)	0.3 ^c (0.1)	88.1 ^a (3.6)